

SCOPUL

Studierea etiologiei, patogeneniei, clinica și metodele de tratament complex al copiilor cu malformații congenitale craniofacială, incluzând despicăturile congenitale ale buzei superioare și palatului, precum și elementele de bază ale prevenirii și reabilitării interdisciplinare a copiilor din acest grup.

Plan tematic

1. Etiologia, patogeneza și profilaxia malformațiilor congenitale ale feței și a maxilarelor (factori exogeni, factori endogeni). .
2. Semne clinice și metode de diagnosticare a unor malformații congenitale ale feței și maxilarelor la copii (inclusiv buza superioară și palatul).
3. Schema de tratament complex și reabilitare medicală a copiilor cu unele malformații congenitale ale feței și maxilarelor, inclusiv despicăturile de buza și palat.
4. Metode de alimentare a copiilor cu despicătură de buza și palatului.

Plan tematic

5. Malformații congenitale sistemice ale feței și gâtului (sindroame). Imaginea clinică și schema de tratament a unor sindroame.
6. Clasificarea despicăturilor congenitale ale buzei superioare și palatului.
7. Clinica (tulburări anatomice și funcționale) în diferite forme de despicături congenitale ale buzei superioare și palatului.

Plan tematic

- 8. Clinica (insuficiență funcțională) în diferite forme de despicături congenitale ale buzei superioare și palatului.
- 9. Caracteristici și metode de alimentare și îngrijire a copiilor cu despicături congenitale ale buzei superioare și palatului.
- 10. Cheiloplastia. Sarcini, metode și indicații de vârstă pentru intervenții chirurgicale. Pregătirea pacienților pentru intervenții chirurgicale.
- 11. Uranoplastia. Sarcini, metode și indicații de vârstă pentru intervenții chirurgicale. Pregătirea pacienților pentru intervenții chirurgicale.
- 12. Reabilitarea medicală a copiilor cu despicături congenitale ale buzei superioare și palatului. Termenii și conținutul perioadei de dispensare.

Întrebări la temă

1. Etiologia malformațiilor congenitale ale unei persoane (factori exogeni, factori endogeni).
2. Patogeneza malformațiilor congenitale ale feței și prevenirea acestora.
3. Malformații congenitale sistemice ale feței și gâtului (sindroame). Imaginea clinică și schema de tratament a unor sindroame.
4. Clasificarea despicăturilor congenitale ale buzei superioare și palatului.
5. Clinica (tulburări anatomice) în diferite forme de despicături congenitale ale buzei superioare și palatului.
6. Clinica (insuficiență funcțională) în diferite forme de despicături congenitale ale buzei superioare și palatului.

Lucrări practice (sarcini)

1. Examinați un copil cu defecte congenitale de dezvoltare facială, cu formularea diagnosticului.
2. A face un plan individual pentru tratamentul complex al unui copil cu o malformație congenitală sindromală a feței, precum și a buzei superioare și palatului cu definirea indicațiilor de vârstă pentru tratamentul chirurgical și de altă natură.
3. Citiți radiografiile oaselor scheletului facial, dinților etc. atunci când examinați pacienții din acest grup.
4. Desfășurați o conversație cu mama cu privire la caracteristicile alimentării și îngrijirii unui copil cu despicătură de buză și palat.

Sarcini de auto-control

Un sfat de alimentare a copilului pentru mama unui copil cu despicătură congenitală camuflată izolată unilaterală a buzei superioare

1. De înfășurat bine copilul în timpul alimentației.
1. De ținut copilul în poziție verticală.
2. Alimentarea cu linguriță.
3. Primele 3 luni să se hrănească de 6 ori pe zi, iar apoi -
4. Ce nu este indicat în răspunsuri sau este indicat incorect?

Sarcini de auto-control

- Dă sfatul mamei. Cum să hrăniți un copil cu o despicătură de buză congenitală completă bilaterală izolată?
- 1. Să fie bine înfășurat copilul.
- 2. Luați copilul în brațe într-o poziție verticală.
- 3. Lapte de la sân folosind o tutelă cu o gaură mare și apoi o lingură.
- 4. În primele 3 luni pentru a alimenta nou-născutul de 6-8 ori pe zi, apoi -
- 5. 20 Ce nu este indicat deloc sau indicat incorect în aceste teste?

Sarcini de auto-control

- Dă sfatul mamei. Cum să hrăniți un nou-născut cu despicare incompletă izolată congenitală a palatului?
- 1. Să fie bine înfășurat
- 2. De ținut în poziție verticală
- 3. Hrăniți numai prin tutelă cu gaura mare și apoi cu o pipetă sau o linguriță în porții mici (în ciuda tuturor dificultăților).
- 4. Primele 3 luni pentru a hrăni 6-8 ori, apoi - de 4 ori pe zi.
- 5. Ce nu este indicat în consiliu sau este indicat incorect?



