

Scopul

A studia tehnica de extracție a dinților permanenți și de lapte, a defini clar indicațiile și contraindicațiile pentru această operație, luând în considerare toate consecințele pozitive și negative ale acestei intervenții. Particularitățile îndepărtării dinților la copiii cu boli somatice concomitente.

Planul tematic

1. Caracteristici anatomice și fiziologice ale structurii țesuturilor din regiunea maxilo-facială.
2. Indicații pentru îndepărtarea dinților temporari și permanenți la copii de vârste diferite.
3. Contraindicații privind îndepărtarea dinților temporari și permanenți la copii de vârste diferite.
4. Echipament și Instrumente pentru îndepărtarea dinților
5. Particularități ale extracției dinților la copiii cu boli somatice concomitente.

Planul tematic

6. Pregătiri pentru operațiunea de extracție a dinților de lapte și permanenți cu diferite maladii.
7. Operația extracției dentare la copii - tehnică pentru înlăturarea dinților temporari și permanenți la copii de vârste diferite
8. Modalități de a ține forcepsul pentru a îndepărta dinții - un semn al unghiului, un semn al îndoirii mânerelor, semnul lateral.

Întrebări la temă

1. Indicații absolute urgente și planificate pentru o operațiune de extracție temporară și permanentă a dintelui.
2. Indicații relative pentru extracția dentară temporară și permanentă.
3. Общие и местные противопоказания к операции удаления временного и постоянного зуба. Contraindicații generale și locale pentru extracția dinților temporari și permanenți.
4. Examinarea și pregătirea pacientului înainte de operația de extracție a dinților.
5. Metode de îndepărtare a dinților temporari.
6. Structura forcepsului pentru îndepărtarea unui dinte temporar.

Întrebări la temă

1. Metode de fixare a forcepsului pentru îndepărtarea dinților.
2. Alegerea instrumentelor pentru îndepărtarea dinților temporari și permanenți în maxilarul superior.
3. Alegerea instrumentelor pentru îndepărtarea dinților temporari și permanenți pe maxilarul inferior.
4. Caracteristicile extragerii dentare la copiii cu boli somatice concomitente.

Lucrări practice (sarcini) efectuate

1. Pregătirea mâinilor înainte de operație.
2. Examinarea și supravegherea pacientului: colectați istoricul; - efectuarea unui examen clinic; - determinarea diagnosticului preliminar și a indicațiilor pentru extracția dinților.
3. Emiterea unui dosar medical al pacientului dentar.
4. Alegerea instrumentelor necesare pentru extragerea dinților.

Sarcini de auto-control



1. Un băiat de 8 ani se plânge de durere la dintele 7.5, care a apărut acum 3 zile și este agravat de mușcături. Anterior, dintele a fost tratat. Obiectiv: la dintele 7.5 există un defect tisular mare, pe membrana mucoasă a procesului alveolar există o fistula în zona dintelui 7.5 cu o secreție slabă, dintele este mobilă de gradul II. Pe R: resorbția rădăcinii distale cu 2/3, distrugerea plăcii de închidere a foliculului 35.
2. Întrebare. 1. Alegeți tactici de tratament, justificați-le. 2. Ce instrumente sunt utilizate pentru a elimina dinții și rădăcinile din maxilarul inferior?

Sarcini de auto-control

- Pacientul A., în vârstă de 16 ani, sa plâns de dureri dureroase periodic în zona dinților 46. Din anamneză, sa descoperit că dintele 46 a fost bolnav în mod repetat, dar pacientul nu a consultat un medic. Obiectiv: coroana dintelui 46 este complet distrusă. Membrana mucoasă a procesului alveolar în zona dintelui 46 nu se modifică. Dinți intacti intacti. Diagnostic: parodontită cronică 46 dinte. Este arătată o extracție a unui dinte 46, dar pacientul observă că, chiar și cu deteriorări minore ale țesuturilor (abraziuni, zgârieturi), are sângerare pe termen lung.
- Întrebare. 1. Ce examinări suplimentare ar trebui efectuate înainte de extragerea dinților? 2. Este necesară consultarea unui specialist? 3. Ce măsuri pregătitoare ar trebui întreprinse pentru a preveni sângerarea?

Sarcini de auto-control

- Pacientul de 7 ani s-a adresat la medic cu părinții care au spus că sa plâns de durere în maxilarul superior spre dreapta, în timp ce mesteca pe alimente solide. Obiectiv: 55 de gri, etanșat, se observă un ușor defect al sigiliului. Percuția 55 este dureroasă, membrana mucoasă din regiunea 55 este hiperemică, palparea este dureroasă. Dintele este mobil. Din anamneză, a devenit cunoscut că 55 de mai multe ori a suferit un tratament terapeutic și după un timp a început să deranjeze din nou.
- Întrebare. 1. Stabiliți un diagnostic. 2. Care este tactica dvs. de tratament?



Animated-Teeth.com



© 2007 WHMDS, Inc.



